



نام دارو:  
آمی تریپتیلین

اشکال دارویی :  
قرص های ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلی گرمی

دسته دارویی :  
ضد افسردگی های سه حلقه ای

مقدار مصرف :

- بزرگسالان : در ابتدا ۲۵ میلی گرم ۲-۴ بار در روز . ممکن است این مقدار بتدریج افزایش یابد . با این حال مصرف روزانه نبایستی از ۱۵۰ میلی گرم در روز تجاوز نماید .
- نوجوانان : در ابتدا ۱۰ میلی گرم ۳ بار در روز و ۲۵ میلی گرم قبل از خواب . حداکثر مقدار مجاز روزانه ۱۰۰ میلی گرم میباشد .
- کودکان ۶-۱۲ سال : ۱۰-۳۰ میلی گرم در روز
- افراد مسن : در ابتدا ۲۵ میلی گرم قبل از خواب. پزشک در صورت لزوم میتواند مقدار مصرف را به حداکثر ۱۰۰ میلی گرم در روز افزایش دهد .
- در صورتی که مصرف یک نوبت از دارو را فراموش کردید، بلافاصله آن را استفاده نمایید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

موارد منع مصرف :

قبل از مصرف در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید :  
سابقه واکنشهای حساسیتی نسبت به این دارو و یا نورتریپتیلین، امی پرامین، دزیپرامین، کلومیپرامین و...  
در صورت ابتلا به سایر بیماریها مانند آسم، افسردگی، تشنج، اختلالات خونی، بزرگی پروستات، گلوکوم، بیماریهای قلبی، اسکیزوفرنی، بیماریهای کلیوی و کبدی، پرکاری تیروئید و مصرف الکل

موارد هشدار و احتیاط :

این دارو اثرات داروهای مضعف سیستم عصبی مرکزی را تشدید می نماید .  
این دارو در برخی از افراد موجب خواب آلودگی میشود؛ لذا از رانندگی و یا کار با ماشین آلاتی که به هوشیاری کامل احتیاج دارند خودداری نمایید .  
این دارو میتواند باعث افزایش حساسیت به نور شود .  
در صورت ابتلا به دیابت توجه داشته باشید که این دارو میتواند موجب تغییر قند خون گردد .

عوارض جانبی :

تاری دید، گیجی، بیوست، عدم تعادل، بیقراری، اشکال در دفع ادرار، افزایش ضربان قلب، صورت ماسک مانند و کند شدن حرکات و خشکی دستها و پاها

تداخلات دارویی :

الکل  
سایر مضعف های سیستم عصبی مرکزی، داروهای ضد آسم و ضد حساسیت ، فنیل افرین، کلونیدین، سایمتیدین، مهار کننده های منو آمین اکسیداز و مهار کننده های پرکاری تیروئید

مصرف در بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری :

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .