

ممانتین

قرص روکشدار ۵ و ۱۰ میلی گرمی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید .

شکل دارویی :

قرص روکشدار ، ممانتین هیدروکلراید ۵ و ۱۰ میلی گرمی

راهنمایی های عمومی :

لازم است قبل از مصرف این دارو چنانچه بیمار دارای هر یک از شرایط زیر می باشد ، پزشک خویش را مطلع سازد :

- سابقه حساسیت نسبت به ممانتین هیدروکلراید

- سابقه نارسایی کلیوی .

مصرف در بارداری :

مصرف این دارو در دوران بارداری با تجویز پزشک و تنها در حالتی مجاز است که مورد مصرف آن کاملاً مشهود باشد .

مصرف در شیردهی :

شواهدی مبنی بر ترشح این دارو در شیر مادر تاکنون گزارش نشده است ، با این حال مصرف آن در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد .

موارد احتیاط :

- کلیرانس ممانتین در مواقع قلبیایی شدن ادرار بعلت رژیم های غذایی ، داروها (نظیر مهارکننده های کربنیک انهیدراز و سدیم بی کربنات) و وضعیت بیمار (مانند اسیدوز توبولار کلیوی و یا عفونت مجاری ادراری) تا ۸۰ درصد کاهش پیدا می کند ، لذا در این موارد باید مصرف دارو با احتیاط صورت گیرد .

- در نارسایی های کلیوی با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود .

- بیماران مصرف کننده ممانتین که اخیراً دچار سکنه قلبی شده اند و یا مبتلا به نارسایی احتقانی قلب ، فشار خون کنترل نشده و صرع می باشند باید به دقت تحت کنترل باشند .

- مصرف همزمان این دارو با برخی از داروها سبب تداخل دارویی می گردد . چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید ، پزشک خود را مطلع سازید :

مصرف همزمان این دارو با داروهای نظیر آمانتادین ، کتامین و دکسترومتورفان موجب افزایش شیوع و شدت عوارض جانبی هر دو دارو می گردد ، لذا باید از مصرف همزمان حتی الامکان پرهیز گردد. ممانتین باعث افزایش اثر داروهای دوپامینژیک و آنتی موسکارینی و کاهش اثر داروهای آنتی سایکوتیک و باربیتورات ها همچنین تغییر اثر داروهای آنتی اسپاسمودیک ، باکلوفن و دانترولن می گردد .

- به استثناء موارد خاص که پزشک لازم بداند ، این دارو در موارد زیر منع مصرف دارد :

حساسیت شناخته شده به ممانتین هیدروکلراید و نارسایی شدید کلیوی .

- این دارو ممکن است باعث سرگیجه و خواب آلودگی شود ، لذا در هنگام رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به دقت خاص دارند احتیاط نمایید .

مقدار و نحوه مصرف :

این دارو دقیقاً مطابق شیوه ای که پزشک دستور داده استفاده نمایید . مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند .