



نام دارو:
ریزاتریپتان

اشکال دارویی :
قرص های ۵ و ۱۰ میلی گرمی

دسته دارویی :
آگونیست رسپتور 5-HT1

موارد مصرف :
درمان سر دردهای میگرنی

مقدار مصرف :
۵-۱۰ میلی گرم برای درمان حملات حاد میگرن در بزرگسالان کافی است .
در صورت عدم پاسخگویی ، دوز بعدی را میتوان به فاصله دو ساعت از دوز اول مصرف نمود . مصرف بیش از ۳۰ میلی گرم این دارو در روز توصیه نمیگردد .
در بیمارانی که بطور همزمان از پروپرانولول استفاده میکنند مقدار ۵ میلی گرم ریزاتریپتان را میتوان حداکثر برای ۳ مرتبه در روز استفاده نمود .

موارد منع مصرف :
• حساسیت نسبت به دارو
• میگرن همی پلژیک

موارد هشدار و احتیاط :
• وجود اختلالات کبدی و یا کلیوی
• هایپرتنشن
• سیگار کشیدن
• چاقی
• دیابت
• در مردان بیش از ۴۰ سال
• هایپرکلسترولمی

عوارض جانبی :
گیجی، خشکی دهان، خواب آلودگی، طپش قلب، تهوع، اسهال، لرزش، تنگی نفس، برافروختگی

تداخلات دارویی :
داروهای حاوی ارگوت
مهارکننده های MAO
داروهای SSRI

مصرف در بارداری و شیردهی :
مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری :
دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .